

Hylenex® (Hyaluronidase) Filler Dissolving Treatment

Pre- and Post-Care Instructions

To ensure a smooth and safe experience, please follow these guidelines:

- **Avoid Blood Thinners:**
 - Refrain from taking aspirin, ibuprofen, naproxen, fish oil, vitamin E, or other blood-thinning supplements 3–5 days before treatment (unless prescribed).
- **Avoid Alcohol:**
 - No alcohol for 24 hours before your appointment to help minimize bruising.
- **Let Us Know:**
 - If you've had any allergic reactions to bee stings or hyaluronidase in the past, please inform us in advance.
 - Also, tell us what type of filler was used, when it was injected, and by whom (if available).
- **Come with Clean Skin:**
 - Arrive with no makeup or skincare products in the area to be treated.

Post-Treatment Instructions

After your Hylenex injection, the area will begin breaking down and dissolving the hyaluronic acid filler. Here's what to expect:

- **Mild Swelling or Bruising:**
 - Some swelling, redness, or bruising is common and usually resolves within a few days. Some people can get severe swelling.
- **Avoid Touching or Massaging:**
 - Do not massage or manipulate the area unless instructed by your provider.
- **Cold Compress (if needed):**
 - You may apply a cool compress to the area for comfort but avoid direct ice on the skin.
- **Avoid Alcohol and Blood Thinners:**

12932 N Dale Mabry Hwy, Tampa FL 33618 813-510-0770

Medical Director: Brianna De Souza, MD, Board Certified Dermatologist

Clinical Director: Rosaly Torres, APRN



- Continue to avoid alcohol, aspirin, and NSAIDs for another 24–48 hours to minimize bruising.
- No Intense Activity:
 - Avoid strenuous exercise for 24 hours post-treatment.
- Wait Before Reinjection:
 - If you’re planning to have new filler placed in the same area, your provider may recommend waiting 2 weeks to allow tissue to settle and ensure complete dissolution.
- Watch for Reactions:
 - Although rare, allergic reactions can occur. If you notice unusual swelling, itching, or difficulty breathing, seek medical attention right away.

If you have a concern, please contact us using the following.

Call (813-510-0770) – Business Hours

Text (656-246-0548) – Business Hours

Text (813-510-0770) – No Business Hours

12932 N Dale Mabry Hwy, Tampa FL 33618 813-510-0770

Medical Director: Brianna De Souza, MD, Board Certified Dermatologist

Clinical Director: Rosaly Torres, APRN

Instrucciones de Cuidado Pre y Post-Tratamiento de Hylenex® (Hialuronidasa) para Disolver Rellenos

Para asegurar una experiencia segura y sin contratiempos, por favor sigue estas instrucciones:

Antes del Tratamiento:

- **Evita los anticoagulantes:**
 - Evita tomar aspirina, ibuprofeno, naproxeno, aceite de pescado, vitamina E u otros suplementos anticoagulantes 3–5 días antes del tratamiento (a menos que te haya sido prescrito).
- **Evita el alcohol:**
 - No consumas alcohol 24 horas antes de tu cita para minimizar el riesgo de moretones.
- **Infórmanos:**
 - Si has tenido reacciones alérgicas a picaduras de abejas o hialuronidasa en el pasado, por favor avísanos con antelación.
 - También indícanos qué tipo de relleno se utilizó, cuándo fue inyectado y por quién (si está disponible esa información).
- **Llega con la piel limpia:**
 - Llega sin maquillaje ni productos para el cuidado de la piel en el área a tratar.

Instrucciones Post-Tratamiento:

Después de tu inyección de Hylenex, el área comenzará a descomponer y disolver el relleno de ácido hialurónico. Aquí te explicamos qué puedes esperar:

- **Hinchazón o moretones leves:**

12932 N Dale Mabry Hwy, Tampa FL 33618 813-510-0770

Medical Director: Brianna De Souza, MD, Board Certified Dermatologist

Clinical Director: Rosaly Torres, APRN

- Es común tener algo de hinchazón, enrojecimiento o moretones, los cuales generalmente se resuelven en unos días. Algunas personas pueden experimentar hinchazón severa.
- **Evita tocar o masajear:**
 - No toques ni masajees el área, a menos que tu proveedor te indique lo contrario.
- **Compresa fría (si es necesario):**
 - Puedes aplicar una compresa fría en el área, pero evita el contacto directo de hielo con la piel.
- **Evita el alcohol y los anticoagulantes:**
 - Continúa evitando el alcohol, aspirina y antiinflamatorios no esteroides (AINEs) por 24–48 horas más para minimizar los moretones.
- **No realices actividad intensa:**
 - Evita hacer ejercicio intenso durante las primeras 24 horas después del tratamiento.
- **Espera antes de la reinyección:**
 - Si planeas colocar un nuevo relleno en el mismo área, tu proveedor puede recomendarte esperar 2 semanas para permitir que los tejidos se estabilicen y asegurar que la disolución sea completa.
- **Observa posibles reacciones:**
 - Aunque es raro, pueden ocurrir reacciones alérgicas. Si notas hinchazón inusual, picazón o dificultad para respirar, busca atención médica de inmediato.

Si tiene alguna preocupación, comuníquese con nosotros utilizando lo siguiente.

Llamar al 813-510-0770 – Durante horas laborables

Texto al 656-246-0548– Durante horas laborables

Texto al 813-510-0770 – Fuera de horas laborables