

Pre & Post Care Male Pleasure Shot

Pre-Care:

- Avoid scheduling this procedure when you are sick or recovering from any acute infection. It is best to schedule a Pleasure Shot when you are in good health.
- Do not take blood thinners or antiplatelet medications, including aspirin, or NSAIDs (such as Advil, Motrin, Ibuprofen), steroids or antibiotics for a period of 7 days prior to the procedure.
- AVOID the following nutritional supplements for 7 days before procedure –Fish oil, Turmeric, Gingko Biloba, Garlic, Vitamin E, Vitamin A, Flax Oil, Curcumin, and other anti-inflammatory OTC substances.
- AVOID Alcohol and Cigarettes for 7 days before the procedure.
- HYDRATE very well the day before and the day of the procedure for ease of blood draw. It is recommended to eat before the procedure as well.

Post-Care:

- You can resume normal activities, including sexual intercourse, the same day, except for strenuous exercise. You can resume exercise in 2 days.
- Do NOT take any anti-inflammatory drugs, such as NSAIDs and alcohol for at least 2 weeks after your procedure.
- You may take Acetaminophen/Tylenol if you experience any mild tenderness or discomfort after the treatment.

What to Expect:

- Bruising is not highly likely but can occur in some cases
- Right after the treatment, the injected area may show temporary redness, which typically diminishes within a few hours.
- You may experience slight tingling, swelling, soreness, or tenderness, which can last for up to three days following the treatment.

If you have a concern, please contact us using the following.

Call (813-510-0770) – Business Hours
Text (656-246-0548) – Business Hours
Text (813-510-0770) – No Business Hours

Cuidado Pre & Post Tratamiento Pleasure Shot

Cuidado Previo:

- Evite programar este procedimiento si está enfermo o recuperándose de cualquier infección aguda. Es mejor programar el Pleasure Shot cuando esté en buena salud.
- No tome anticoagulantes ni medicamentos antiplaquetarios, incluidos aspirina, o AINEs (como Advil, Motrin, Ibuprofeno), esteroides o antibióticos durante un período de 7 días antes del procedimiento.
- EVITE los siguientes suplementos nutricionales durante 7 días antes del procedimiento: aceite de pescado, cúrcuma, Ginkgo Biloba, ajo, vitamina E, vitamina A, aceite de linaza, curcumina y otros antiinflamatorios de venta libre.
- EVITE el alcohol y los cigarrillos durante 7 días antes del procedimiento.
- HIDRÁTESE muy bien el día anterior y el día del procedimiento para facilitar la extracción de sangre. Se recomienda comer antes del procedimiento también.

Cuidado Posterior:

- Puede reanudar sus actividades normales, incluida la relación sexual, el mismo día, excepto ejercicios físicos intensos. Puede reanudar el ejercicio a los 2 días.
- NO tome medicamentos antiinflamatorios, como AINEs ni alcohol durante al menos 2 semanas después del procedimiento.
- Puede tomar Acetaminofén/Tylenol si experimenta alguna leve sensibilidad o molestia después del tratamiento.

Qué esperar:

- Los moretones no son muy comunes, pero pueden ocurrir en algunos casos.
- Justo después del tratamiento, el área inyectada puede mostrar enrojecimiento temporal, que generalmente disminuye en unas pocas horas.
- Puede experimentar un ligero hormigueo, hinchazón, dolor o sensibilidad, lo cual puede durar hasta tres días después del tratamiento.

Si tiene alguna preocupación, por favor contáctenos utilizando los siguientes medios:

Llame al (813-510-0770) – Durante horas laborables

Envíe un mensaje de texto al (656-246-0548) – Durante horas laborables

Envíe un mensaje de texto al (813-510-0770) – Fuera de horas laborables